



Blatt4-
Uebungen...

Dr. Markus Schröder

Mathematik Vorbereitungskurs
Übungen Differentialrechnung

f hat
ein lok. Maximum
ein lok. Minimum
ein Wendepkt
eine Sattelpkt

P hat
ein Wendepkt & WP
ein lok. Maximum
ein lok. Minimum
eine Wendepkt & WP
eine Wendepkt & WP

P hat
ein Wendepkt & WP
ein lok. Maximum
ein lok. Minimum
eine Wendepkt & WP
eine Wendepkt & WP

Aufgabe 1

Nachfolgend ist der Graph einer Funktion f gegeben. Ergänzen Sie diesen um eine Skizze seiner ersten (f') und seiner zweiten Ableitung (f'').

Dr. Markus Schröder

Mathematik Vorbereitungskurs
Übungen Differentialrechnung

Aufgabe 2

Skizzieren Sie $f'(x)$

Quelle: <http://www.mathe-framer.de/Klausur10/Ganzrationale%20Funktionen/grafischer2Dableiten/Block1/Aufg2/Aufg.htm>
<https://6e.scrib.to.org/mathe/26407/aufgaben-zum-angewandten-differenzieren>

Dr. Markus Schröder

Mathematik Vorbereitungskurs
Übungen Differentialrechnung

Aufgabe 3

Bestimmen Sie die Lage und Art der Extremstellen der folgenden Funktionen f_1 und f_2 . Bestimmen Sie weiterhin ihre Wendestellen (Anzahl nur notwendige Belegung).

$f_1(x) = x^4 - 8x^2 - 9$

$f_2(x) = \frac{1}{5}x^5 + \frac{3}{2}x^3 + \frac{5}{3}x^2$

Zusatz:

Folgende Aufgaben sind jeweils auszuführen:

(i) Bestimmen Sie die Nullstellen und geben Sie die Linearfaktorzerlegung an.

(ii) Ermitteln Sie die Schnittstelle mit der y-Achse.

(iii) Untersuchen Sie die Funktion auf das Bandverhalten.

(iv) Skizzieren Sie den Graph der Funktion in ein Koordinatensystem.

Aufgabe 4

Nach Einnahme eines Medikaments kann man dessen Konzentration im Blut eines Patienten messen. Für die ersten 6 Stunden beschreibt die Funktion f mit der Gleichung $f(t) = 10t \cdot e^{-0.5t}$ die im Blut vorhandene Menge des Medikaments in Milligramm pro Liter in Abhängigkeit von der Zeit t .

(i) Berechnen Sie die maximale Konzentration des Medikaments im Blut und den Zeitpunkt, zu dem sie vorhanden ist.

(ii) Bestimmen Sie den Zeitpunkt, zu dem das Medikament am stärksten abgebaut wird.

Nach 6 Stunden erfolgt der Abbau näherungsweise linear

(iii) Der lineare Abbau nach 6 Stunden wird näherungsweise durch die Tangente k am Graphen von f im Punkt $P(6, f(6))$ beschrieben. Bestimmen Sie die Geradengleichung der Tangente und damit den Zeitpunkt, zu dem das Medikament unter dieser Annahme vollständig abgebaut ist.

Dr. Markus Schröder

Mathematik Vorbereitungskurs
Übungen Differentialrechnung

Aufgabe 5

Ein Designer (Gestalter!) beschließt, seine zylindrische Hauterme-Dose in einer Kugel zu verpacken. Diese soll den Radius $R = 5$ cm besitzen. Wie groß ist dann das maximale Volumen V des in der Kugel unterzubringenden Zylinders, überlegt er. Aus dem Mathematik-Unterricht von Herrn Prodekul weiß er noch $V_{\text{Zylinder}} = r^2 \pi h$, und nach einigem Nachdenken erkennt er (Begründung??) $R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 \Leftrightarrow 25 = r^2 + \frac{h^2}{4}$.

Helfen Sie ihm weiter. Bestimmen Sie den Radius r und die Höhe h des optimalen Zylinders. Wie groß ist sein Volumen V ? Passt eine Creme mit 300 ml hinein?

Aufgabe 6

a) Bestimmen Sie den Funktionsterm einer ganzrationalen Funktion 3. Grades, dessen Graph durch die Punkte $A(1 | -32)$, $B(-2 | 4)$, $C(-3 | 0)$ und $D(0 | 0)$ verläuft.

b) Geachtet ist eine Funktion 3. Grades. Sie hat im Punkt $(0, 0)$ eine Extremstelle, in $x = 3$ eine Nullstelle und in $x = 1$ die Steigung -3 . Bestimmen Sie die gesuchte Funktionsgleichung!

c) Bestimmen Sie den Term einer achsensymmetrischen ganzrationalen Funktion 4. Grades, welche durch den Punkt $P(0 | 1)$ verläuft und an der Stelle $x = 1$ eine Nullstelle und ein Minimum besitzt.

Ableitungen: $f'(x) = x^4 + 6x^3 + 8x^2$
 $f'(6) = 4x^3 + 18x^2 + 16x$
 $f''(x) = 12x^2 + 36x + 16$

Erstens:

① N.H. Bed.: $f'(x) = 0$
 $x^4 + 6x^3 + 8x^2 = 0$
 $x^2 \cdot (x^2 + 6x + 8) = 0$
 $x^2 = 0$ oder $x^2 + 6x + 8 = 0$
 $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{3^2 - 8} = -3 \pm 1$
 $x_{1,2} = -4$ oder $x_{1,2} = -2$
oder $x_{1,2} = -4$ oder $x_{1,2} = -2$
oder $x_{1,2} = -4$ oder $x_{1,2} = -2$

② H.H. Bed.:
 $f''(x) = 0$ oder $f''(x) = 0$
 $f''(x) = 12x^2 + 36x + 16 = 0$
 $x_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 4} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 4}$
 $x_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 4}$
 $x_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 4}$
 $x_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 4}$

③ y-KO:
 $f(0) = 0 \Rightarrow SP(0 | 0)$
 $f(-4) = \frac{1}{5}(-4)^5 + \frac{3}{2}(-4)^3 + \frac{5}{3}(-4)^2 = 8,55 \Rightarrow MAX(-4 | 8,55)$
 $f(-2) = \frac{1}{5}(-2)^5 + \frac{3}{2}(-2)^3 + \frac{5}{3}(-2)^2 = -3,175 \Rightarrow MIN(-2 | -3,175)$

In GeoGebra: (Potter Suite, CAS-Ansicht)

② y-KO:
 $f(0) = 0$
 $f(-3.28) = 3.58707285973$
 $f(-1.22) = -2.059801125973$

WolframAlpha

1/5x^5+3/2x^4+8/3x^3

NATURAL LANGUAGE MATH INPUT EXTENDED KEYBOARD EXAMPLES UPLOAD RANDOM

Input: $\frac{1}{5}x^5 + \frac{3}{2}x^4 + \frac{8}{3}x^3$

Plots:

Alternate forms: $\frac{1}{30}x^3(6x^2 + 45x + 80)$

Roots: $x = 0$

WolframAlpha

1/5x^5+3/2x^4+8/3x^3

NATURAL LANGUAGE MATH INPUT EXTENDED KEYBOARD EXAMPLES UPLOAD RANDOM

Input: $\frac{1}{5}x^5 + \frac{3}{2}x^4 + \frac{8}{3}x^3$

Plots:

Alternate forms: $\frac{1}{30}x^3(6x^2 + 45x + 80)$

Roots: $x = 0$